土壤外切-β-1，4-葡聚糖酶/纤维二糖苷酶（S-C1）活性测定

试剂盒说明书

分光光度法 50 管/24 样

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

测定意义：

C1（EC3.2.1.91）存在于细菌、真菌和动物体内，是纤维素酶系的组份之一，C1 催化多聚糖链的末端非还原端释放出纤维二糖和葡萄糖。

测定原理：

采用 3,5－二硝基水杨酸法测定 C1 催化微晶纤维素降解产生的还原糖的含量。

试剂的组成和配制：

产品名称	SSQ034-50T/24S	Storage
提取液：液体	50ml	4℃
试剂一：液体	15ml	4℃
试剂二：液体	60ml	4℃
说明书	一份	

自备仪器和用品：

可见分光光度计、水浴锅、离心机、可调式移液器、1ml 玻璃比色皿、研钵、冰和蒸馏水。

样品测定的准备：

称取约 0.1g 新鲜土样或风干土样，加入 1ml 提取液，进行冰浴匀浆，室温振荡提取 30min，然后 10000g 4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。

测定步骤：

1、分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 540nm，蒸馏水调零。

2、加样表（在 EP 管中依次加入下列试剂）：

试剂名称（μl）	测定管	对照管
样本	50	50
试剂一	500	
蒸馏水		500

最终解释权所有 © 伊势久（江苏连云港）生物科技有限责任公司，保留一切权利

混匀，37℃准确水浴 2h

试剂二	1000	1000

混匀， 90℃水浴 10min（盖紧，防止水分散失），冷却后，测 540nm 下吸光值 A，计算ΔA=A 测定管-A 对照管。每个测定管需设一个对照管。

S-C1 活性计算：

标准条件下测定回归方程为 y = 6.4078x - 0.0673；x 为标准品浓度（mg/ml），y 为吸光值。

单位的定义：每 g 土样每分钟催化产生 1μg 葡萄糖定义为一个酶活力单位。

S-C1 活力(μg /min /g 鲜重)=[1000×(ΔA+0.0673) ÷6.4078×V 反总]÷(W× V 样÷V 样总) ÷T=14.305×(ΔA+0.0673) ÷W

1000：1mg/ml=1000ug/ml；V 反总：反应体系总体积，0.55ml； V 样：加入样本体积，0.05 ml；V 样总：加入提取液体积，1 ml；T：反应时间，120 min；W：样本质量，g。

最终解释权所有 © 伊势久（江苏连云港）生物科技有限责任公司，保留一切权利